

# AVERTISSEMENTS agricoles



## GRANDES CULTURES

**BULLETIN N° 6 DU 20 AVRIL 1993**

### BLE D'HIVER

**Rouille jaune** : Extension à tout le littoral Flamand.

RITMO, SLEJPNER, VIKING,...

**Oïdium** : Nette installation. APOLLO, SIDERAL, RECITAL

**Mouche grise** : Symptômes ça et là

**Fusariose** : Quelques dégâts.

### ESCOURGEON

**Helminthosporiose** : Progression sensible

### ORGE DE PRINTEMPS

Peu de maladies

### POIS

**Thrips** : Confirmation du risque

### LIN

**Altises** : Un peu. Attendre

[Av. agric. N. Pde Calais -  
Spécialité cultures]  
1989 ->  
U 984-0788  
L-30-53556

### BLE D'HIVER

#### ► SITUATION :

**Stades** : Lente évolution vers 1er Noeud, atteint dans les parcelles les plus précoces (région de Montreuil) le stade moyen est épi 2 cm environ.

#### Maladies

**Rouille jaune** : Nette aggravation depuis la semaine dernière. De nombreuses parcelles concernées sur tout le littoral Mer du Nord.

**SLEJPNER** est la principale variété concernée, (souvent 20 à 50% de pieds touchés), mais la plus forte attaque que nous ayons observée concerne la variété **RITMO** ou dans une parcelle 100 % des pieds sont touchés y compris sur feuilles supérieures.

**VIKING** présente localement de belles attaques. Des symptômes sont signalés également sur **BEAVER** et **RIBAND**.

Aucun cas signalé pour l'instant à plus de 10 Km de la Mer.

**Oïdium** : Progression sensible mais rarement très grave.

Concerne environ 30 % des **APOLLO**, puis **VIKING**, **SIDERAL**, **RECITAL**.

**Piétin - Septoriose** : Maintien à un niveau de risque élevé.

**Fusariose** : Localement quelques fortes attaques sur semences de ferme. Observez la base des tiges entièrement brun-rouge et pourrie. Des pieds disparaissent complètement. Ces dégâts très tardifs concernent en fait des semis précoces qui jusqu'au réchauffement des températures avaient toléré une pression de maladie plus ou moins importante.

**Mouche grise** : Pleine période d'expression de l'attaque.

Certaines talles disparaissent avec la feuille centrale entièrement jaune orange et la 2ème feuille jaunissante. L'asticot est facile à trouver dans la tige. Les pieds non ou peu tallés disparaissent complètement.

Symptômes bien visibles cette année dans les secteurs traditionnels des cranettes de l'Artois, du Lensois et du Cambrésis, ainsi que dans les sables de Flandre Maritime et du Montreuillois.

ministère de l'agriculture et de la forêt



D.R.A.F. - S.R.P.V.  
Cité Administrative - 59048 LILLE CEDEX - Tél. 20.52.00.25

STATION REGIONALE : (dont Avertissements Agricoles)  
Z.A.L. du Grand Mont - Rue B. Palissy - B.P. 47 - 62750 LOOS-EN-GOHELLE - Tél. 21.28.27.27

Abonnement  
annuel :  
A l'ordre  
Régisseur de Recettes  
D.R.A.F. Nord-Pas-de-Calais  
ISSN 0758-7988 - CPPAP N°1865 AD

PAA

En général moins de 5 % des pieds sont concernés, 10 - 20 % dans quelques cas graves. 1 Parcelle retournée près de Gravelines (mauvaise implantation + mouche grise).

**Carences printanières** : en début montaison on observe traditionnellement des carences passagères dues à un déséquilibre entre croissance foliaire et alimentation minérale.

Certaines variétés semblent réagir fortement, c'est le cas de RIBAND qui localement présente des nécroses foliaires spectaculaires mais sans gravité pour la suite de la culture. (Région CALAIS, LILLE, etc...).

#### ► PRECONISATION :

Début des interventions montaison avec fongicides polyvalents. En cas de rouille jaune déclarée, ne pas prendre de retard et utiliser des matières actives curatives soit seules, soit en complément d'un anti-piéti ex : *cyproconazole* (ALTO), *hexaconazole* (PLANETE R), *tébuconazole* (HORIZON).

### ESCOURGEON

#### ► SITUATION :

**Stades** : Comme les blés de Epi 1 cm à 1er Noeud.

**Maladies** : *Helminthosporiose* : Progression sensible, nombreux repiquages sur feuilles supérieures .

*Rouille naine* : En baisse

*Oïdium, Rhynchosporiose* : Parfois bien installés

#### ► PRECONISATION :

1er fongicide à envisager rapidement, visant dans la plupart des parcelles un complexe helminthosporiose- oïdium et taches brunes.

Préférer pour ce traitement, les associations *triazoles* + *morpholines* (ou *piperidines*).

EX : ARCHER, INITIAL, AURORE, PLUTON, MELTOP 500 , EVREST, GRANIT TR, ...).

### ORGE DE PRINTEMPS

#### ► SITUATION :

**Stades** : Début tallage souvent dépassé.

**Maladies** : Faible pression générale. Début installation *Helminthosporiose*, *Oïdium*.

*Pucerons* : Absents

*Mouches grises* : Localement des dégâts (ex : Sables région Montreuil)

#### ► PRECONISATION

Pas d'intervention pour le moment ni en fongicide, ni en insecticide.

Terminer rapidement les désherbages.

### POIS

#### ► SITUATION :

**Insectes** : *Thrips* : Bien présents cette année, se maintiennent longtemps suite aux températures basses. Occasionnent fréquemment des déformations et des taches décolorées sur le feuillage.

*Sitones* : Début d'activité.

#### ► PRECONISATION :

Intervenir sur *Thrips*, si justifié.

Attendre une bonne levée des adventices avant d'intervenir en post. Les levées sont parfois irrégulières, à cause du manque d'eau en Mars.

Si nécessaire intervenir en fractionné : 1er traitement précoce suivi d'un 2ème traitement 10 à 15 jours plus tard.